

برگه راهنما: اطلاعات برای استفاده بیمار

آداون

محلول غلیظ برای تهیه محلول جهت انفوزیون
مخلوط ریز مغذی ها

قبل از استفاده از این دارو برگه راهنما را به دقت مطالعه نمایید.

- این برگه را نزد خود نگهدارید. ممکن است مجدد به مطالعه آن نیاز داشته باشید.
- در صورت بروز سوالات بیشتر، به پزشک یا داروساز مراجعه نمایید.
- در صورت بروز هر گونه عارضه جانبی، از جمله عوارض جانبی عنوان نشده در این راهنما به پزشک خود یا داروساز اطلاع دهید.

در این راهنما می خوانید:

۱. آداون چیست و چه کاربردی دارد.
۲. قبل از استفاده از آداون به چه اطلاعاتی نیاز دارید.
۳. نحوه تجویز آداون

۴. عوارض جانبی احتمالی

۵. نحوه نگهداری از آداون

۶. محتویات بسته بندی و سایر اطلاعات

۱. آداون چیست و چه کاربردی دارد

آداون دارویی است که حاوی ریزمغذی هاست. ریزمغذی ها مواد شیمیایی با مقادیر جزئی است که بدن برای انجام فعالیت طبیعی به آنها نیاز دارد. آداون هنگامی که امکان مصرف خوراکی وجود ندارد، به صورت وریدی تجویز می شود. معمولاً این دارو به عنوان بخشی از رژیم غذایی متعادل شده وریدی به همراه پروتئین، چربی، کربوهیدرات، املاح و ویتامینها مصرف می شود.

۲. قبل از مصرف آداون چه نکاتی را باید بدانید

در موارد ذیل نباید آداون برای شما تجویز شود:

- حساسیت به هریک از اجزای فرمولاسیون (طبق فهرست بخش ۶). در صورت بروز جوش یا هر واکنش آلرژیک دیگری (نظیر خارش، تورم لب یا صورت، یا تنگی نفس) فوراً" به پزشک خود اطلاع دهید.
- انسداد صفراوی
- ابتلا به بیماری Wilson (نوعی اختلال ژنتیکی که طی آن مس در بدن تجمع می یابد)

– آداون نباید برای کودکان با وزن کمتر از ۱۵ کیلوگرم تجویز شود.

موارد هشدار و احتیاط:

در صورت ابتلا به مشکلات کبدی یا کلیوی ، به پزشک خود اطلاع دهید.

پزشک ممکن است جهت بررسی شرایط شما، بطور منظم آزمایش خون درخواست دهد.

آداون و سایر داروها:

در صورتیکه داروی دیگری مصرف می کنید و یا به تازگی مصرف کرده اید یا ممکن است مصرف نمایید، موضوع را با پزشک خود یا داروساز در میان بگذارید.

بارداری و شیردهی:

در صورت بارداری ، شیردهی یا احتمال بارداری ، پیش از مصرف این دارو با پزشک خود مشورت کنید.

رانندگی و کار با ماشین آلات:

آداون اثری بر رانندگی یا کار با ماشین آلات ندارد.

۳. نحوه تجویز آداون

این دارو توسط کارشناس امور سلامت برای شما تجویز می شود. تجویز به صورت انفوزیون وریدی و مستقیماً داخل ورید انجام می شود. دوز تجویزی توسط پزشک مشخص می شود. دوز توصیه شده برای بزرگسالان ۱۰ میلی لیتر در روز است. آداون قبل از تجویز باید با محلول دیگری رقیق شود. پزشک خود یا پرستار قبل از تجویز از نحوه آماده سازی صحیح آداون اطمینان حاصل می کنند.

مصرف در کودکان:

دوز توصیه شده برای کودکان با وزن بیش از ۱۵ کیلوگرم، معادل ۰/۱ میلی لیتر به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در روز است.

مصرف بیش از حد مجاز آداون

امکان مصرف آداون بیش از حد تجویز شده بسیار غیر محتمل است. زیرا پزشک یا پرستار در حین درمان شما را کنترل می کنند. با این حال چنانچه گمان کردید بیش از حد مجاز آداون دریافت کرده اید، فوراً" به پزشک یا پرستار اطلاع دهید. چنانچه سوالات بیشتری در خصوص این دارو دارید، از پزشک خود یا پرستار بپرسید.

۴. عوارض جانبی احتمالی

هیچ عارضه جانبی شناخته شده ای در رابطه با مصرف آداون گزارش نشده است. با این حال در صورت بروز هر گونه عارضه جانبی به پزشک خود یا پرستار اطلاع دهید.

۵. نحوه نگهداری از آداون

دور از دید و دسترس کودکان نگهداری کنید.

بعد از پایان یافتن تاریخ انقضای مندرج روی جعبه و ویال از مصرف این دارو خودداری کنید. تاریخ انقضا به آخرین روز ماه اشاره دارد.

در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری نمایید.

پزشک شما و داروساز بیمارستان مسئول نگهداری صحیح، تجویز و امحای انفوزیون آداون هستند.

پس از رقیق کردن: افزودن آداون باید بلافاصله قبل از شروع انفوزیون صورت گیرد و باید طی ۲۴ ساعت مصرف شود. چنانچه فوراً مصرف نشود، مسئولیت زمان و شرایط قبل از مصرف بر عهده مصرف کننده است و بطور معمول نباید بیش از ۲۴ ساعت در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتیگراد باشد. مگر آنکه رقیق سازی در محل کنترل شده و شرایط آسپتیک معتبر صورت گرفته باشد.

هرگونه داروی باقیمانده پس از درمان باید از طریق روش های تایید شده بیمارستانی امحا شود.

۶. محتویات بسته بندی و سایر اطلاعات

محتویات انفوزیون آداون

- مواد موثره در یک آمپول (۱۰ میلی لیتری) عبارتست از:

- Chromic chloride hexahydrate 53.3 µg
- Copper chloride dihydrate 1.02 mg
- Ferric chloride hexahydrate 5.40 mg
- Manganese chloride tetrahydrate 198 µg
- Potassium iodide 166 µg
- Sodium fluoride 2.10 mg
- Sodium molybdate dihydrate 48.5 µg

- Sodium selenite anhydrous 173 μg
- Zinc chloride 10.5 mg

سایر ترکیبات شامل زایلیتول، هیدروکلریک اسید و آب قابل تزریق می باشند.

شکل آداون و محتویات بسته بندی

آداون محلولی شفاف و تقریباً بی رنگ از ریز مغذی هاست.

آداون به صورت محلول کنسانتره در آمپولهای پلی پروپیلنی ۱۰ میلی لیتری و به تعداد ۲۰ آمپول در یک جعبه عرضه می شود.

شرکت تولید کننده

فرزنیوس کابی – نروژ و سوئد

تاریخ آخرین بازننگری

مارچ ۲۰۱۵

شرکت وارد کننده

درمان یاب دارو